




Series : WXYZ/S

SET ~ 2

रोल नं.

Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

56/S/2

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।

Please check that this question paper contains 23 printed pages.



(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।

Please check that this question paper contains 33 questions.

(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.

(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

#



रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

56/S/2

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

16×1=16

1. जब HI के साथ फेनिल मेथिल ईथर को गरम किया जाता है, तो यह बनाता है :
 - (A) मेथिल क्लोराइड और आयोडोबेन्ज़ीन
 - (B) बेन्ज़ीन और मेथेनॉल
 - (C) आयोडोबेन्ज़ीन और मेथेनॉल
 - (D) फ़ीनॉल और मेथिल आयोडाइड
2. निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन-सा कक्ष ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा ?
 - (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2\text{OH}$
 - (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 - (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
 - (D) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) **Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) **Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) **Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculator is **not** allowed.

SECTION A

Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each. $16 \times 1 = 16$

1. When phenyl methyl ether is heated with HI, it produces :
 - (A) Methyl chloride and Iodobenzene
 - (B) Benzene and Methanol
 - (C) Iodobenzene and Methanol
 - (D) Phenol and Methyl iodide

2. Out of the following organic compounds, the one which will react with Lucas reagent at room temperature is :
 - (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2\text{OH}$
 - (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 - (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
 - (D) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$



3. निम्नलिखित ऐमीनों में से किसका क्वथनांक उच्चतम है ?
- (A) 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनेमीन
(B) 3-मेथिलब्यूटेनेमीन
(C) 2-मेथिलब्यूटेनेमीन
(D) पेन्टेनेमीन
4. एक यौगिक $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ जल में पूर्णतया वियोजित हो जाता है। वान्ट हॉफ गुणांक (i) है :
- (A) 9
(B) 6
(C) 4
(D) 3
5. निम्नलिखित हैलाइडों में से किसमें $\text{C}_{\text{sp}^2} - \text{X}$ आबंध उपस्थित है ?
- (A) ऐल्किल हैलाइड
(B) ऐलिल हैलाइड
(C) बेन्ज़िल हैलाइड
(D) वाइनिल हैलाइड
6. निम्नलिखित यौगिकों में से फ्रेऑन को पहचानिए :
- (A) CCl_2F_2
(B) CCl_2Br_2
(C) $\text{CH}_2\text{Cl} - \text{CHCl}_2$
(D) $\text{CHCl}_2 - \text{CHCl}_2$
7. +1 और +2 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाने वाला संक्रमण तत्त्व है :
- (A) Sc
(B) Mn
(C) Cu
(D) Zn





3. Which of the following amines has the highest boiling point ?
- (A) 2,2-Dimethyl propanamine
 - (B) 3-Methylbutanamine
 - (C) 2-Methylbutanamine
 - (D) Pentanamine
4. A compound $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ undergoes complete dissociation in water. The Van't Hoff factor (i) is :
- (A) 9
 - (B) 6
 - (C) 4
 - (D) 3
5. Which one of the following halides contains $\text{C}_{\text{sp}^2} - \text{X}$ bond ?
- (A) Alkyl halide
 - (B) Allyl halide
 - (C) Benzyl halide
 - (D) Vinyl halide
6. Identify the Freon from the following compounds :
- (A) CCl_2F_2
 - (B) CCl_2Br_2
 - (C) $\text{CH}_2\text{Cl} - \text{CHCl}_2$
 - (D) $\text{CHCl}_2 - \text{CHCl}_2$
7. The transition element which shows both +1 and +2 oxidation states is :
- (A) Sc
 - (B) Mn
 - (C) Cu
 - (D) Zn



8. यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध-आयु 1386 s है, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है :
- (A) $0.5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(B) $0.5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
(C) $5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(D) $5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
9. 'A', 'B' और 'C' के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः + 0.68 V, - 2.54 V और - 0.50 V हैं। उनकी अपचायक क्षमता का क्रम है :
- (A) $A > B > C$
(B) $A > C > B$
(C) $B > C > A$
(D) $C > B > A$
10. सिल्वर नाइट्रेट जिंक पात्र में संचित नहीं किया जाता है, क्योंकि :
- (A) सिल्वर नाइट्रेट अपघटित हो जाता है
(B) Ag^+ अपचित हो जाता है
(C) Ag ऑक्सीकृत हो जाती है
(D) Zn अपचित हो जाता है
11. ग्लूकोस, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देता है :
- (A) ग्लूकोनिक अम्ल
(B) हैक्सेनॉइक अम्ल
(C) सैकैरिक अम्ल
(D) ग्लाइकोलिक अम्ल
12. 298 K पर Ar(g) , $\text{CO}_2(\text{g})$, HCHO(g) और $\text{CH}_4(\text{g})$ के लिए K_H के मान क्रमशः 40.38, 1.69, 1.84×10^{-5} और 0.418 kbar हैं। जब इन गैसों को उनकी घुलनशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो सही क्रम है :
- (A) $\text{HCHO} > \text{CH}_4 > \text{CO}_2 > \text{Ar}$
(B) $\text{HCHO} > \text{CO}_2 > \text{CH}_4 > \text{Ar}$
(C) $\text{Ar} > \text{CO}_2 > \text{CH}_4 > \text{HCHO}$
(D) $\text{CH}_4 > \text{CO}_2 > \text{Ar} > \text{HCHO}$





8. If the half-life period of a first order reaction is 1386 s, then the rate constant of this reaction is :
- (A) $0.5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(B) $0.5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
(C) $5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(D) $5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
9. The standard electrode potential of 'A', 'B' and 'C' are + 0.68 V, - 2.54 V and - 0.50 V respectively. The order of their reducing power is :
- (A) $A > B > C$
(B) $A > C > B$
(C) $B > C > A$
(D) $C > B > A$
10. Silver nitrate is not stored in Zn vessel because :
- (A) Silver nitrate gets decomposed (B) Ag^+ gets reduced
(C) Ag gets oxidised (D) Zn gets reduced
11. Glucose on reaction with nitric acid gives :
- (A) Gluconic acid
(B) Hexanoic acid
(C) Saccharic acid
(D) Glycolic acid
12. The value of K_H for $\text{Ar}(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{HCHO}(\text{g})$ and $\text{CH}_4(\text{g})$, are 40.38, 1.69, 1.84×10^{-5} and 0.418 kbar respectively at 298 K. When these gases are arranged in decreasing order of solubility, the correct order is :
- (A) $\text{HCHO} > \text{CH}_4 > \text{CO}_2 > \text{Ar}$
(B) $\text{HCHO} > \text{CO}_2 > \text{CH}_4 > \text{Ar}$
(C) $\text{Ar} > \text{CO}_2 > \text{CH}_4 > \text{HCHO}$
(D) $\text{CH}_4 > \text{CO}_2 > \text{Ar} > \text{HCHO}$



प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : अभिक्रिया $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ की आण्विकता 2 प्रतीत होती है।

कारण (R) : दी गई प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारकों के दो अणु सम्मिलित हैं।

14. अभिकथन (A) : p-नाइट्रोफ़ीनॉल की तुलना में p-मेथॉक्सीफ़ीनॉल प्रबलतर अम्ल है।

कारण (R) : मेथॉक्सी समूह – I प्रभाव दर्शाता है, जबकि नाइट्रो समूह + I प्रभाव दर्शाता है।

15. अभिकथन (A) : ऐक्टिनॉयड्स ऑक्सीकरण अवस्थाओं का वृहद परास दर्शाते हैं।

कारण (R) : 5f, 6d और 7s कक्षकों की तुलनीय ऊर्जाओं के कारण।

16. अभिकथन (A) : हैलोऐरीनों में मेटा स्थिति पर $-NO_2$ समूह की उपस्थिति उनकी नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता बढ़ा देती है।

कारण (R) : $-NO_2$ समूह बेन्जीन वलय पर से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है फलतः हैलोऐरीनों पर नाभिकरागी का आक्रमण सरल हो जाता है।





For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. *Assertion (A):* The molecularity of the reaction $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$ appears to be 2.

Reason (R): Two molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction.

14. *Assertion (A):* p-methoxyphenol is a stronger acid than p-nitrophenol.

Reason (R): Methoxy group shows – I effect whereas nitro group shows + I effect.

15. *Assertion (A):* Actinoids show wide range of oxidation states.

Reason (R): Due to comparable energies of 5f, 6d and 7s orbitals.

16. *Assertion (A):* Presence of –NO₂ group at meta position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions.

Reason (R): –NO₂ group decreases the electron density over the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile on haloarenes.



खण्ड ख

17. (क) ईंधन सेल की परिभाषा लिखिए। सामान्य सेल की अपेक्षा ईंधन सेल के दो लाभ लिखिए। 2
- अथवा
- (ख) निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत-अपघटन के उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए : 2
- (i) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H_2SO_4 का तनु विलयन
- (ii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ $CuCl_2$ का जलीय विलयन
18. (क) ऐनिलीन और N,N-डाइमेथिलऐनिलीन में रसायनतः विभेद करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए।
- (ख) सामान्य परिस्थितियों में क्लोरोबेन्ज़ीन के ऐमोनी अपघटन के द्वारा ऐनिलीन का विरचन क्यों नहीं किया जा सकता है ? 2
19. विशा ने 'A' और 'B' दो विद्युत-अपघट्यों के विलयनों का तनुकरण किया। उसने प्रेक्षित किया कि 'A' के Λ_m में 1.6 गुना वृद्धि हुई जबकि 'B' के Λ_m में 22 गुना वृद्धि हुई। इन दोनों में से कौन-सा दुर्बल विद्युत-अपघट्य है और क्यों ? 2
20. कारण देते हुए व्याख्या कीजिए कि किसी दी गई अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कैसे प्रभावित होगा जब : 2
- (क) ताप बढ़ा दिया जाए।
- (ख) उत्प्रेरक मिला दिया जाए।
21. निम्नलिखित के मध्य एक-एक अंतर दीजिए : 2
- (क) प्रोटीनों की α -हेलिक्स और β -प्लीटेड शीट संरचना
- (ख) ऐमिलोस और ऐमिलोपेक्टिन





SECTION B

17. (a) Define Fuel cell. Write two advantages of fuel cell over ordinary cell. 2

OR

- (b) Predict the products of electrolysis in each of the following : 2
- (i) A dilute solution of H_2SO_4 with platinum electrodes
- (ii) An aqueous solution of CuCl_2 with platinum electrodes

18. (a) Name the reaction which can be used to distinguish chemically between aniline and N,N-dimethylaniline.
- (b) Why can aniline not be prepared by the ammonolysis of chlorobenzene under normal conditions ? 2

19. Visha diluted the solutions of two electrolytes 'A' and 'B'. She observed that Λ_m of 'A' increased 1.6 times whereas Λ_m of 'B' increased 22 times. Which of the two is a weak electrolyte and why ? 2

20. By giving reasons, explain that how the rate of reaction for a given reaction will be affected when : 2
- (a) the temperature is increased.
- (b) catalyst is added.

21. Give one point of difference between the following : 2
- (a) α -helix and β -pleated sheet structure of proteins
- (b) Amylose and Amylopectin



खण्ड ग

22. अभिक्रिया $A + 2B \rightarrow C + 2D$ की बलगतिकी अध्ययन के दौरान निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए :

प्रयोग	प्रारंभिक [A] (mol/L)	प्रारंभिक [B] (mol/L)	C के विरचन का प्रारंभिक वेग (M min ⁻¹)
1	0.10	0.10	3.0×10^{-4}
2	0.30	0.30	9.0×10^{-4}
3	0.10	0.30	3.0×10^{-4}
4	0.20	0.40	6.0×10^{-4}

प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की समग्र कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक लिखिए।

3

23. 298 K पर निम्नलिखित सेल का वि.वा. बल (emf) परिकलित कीजिए :

3



दिया गया है : $E^\circ_{\text{सेल}} = 2.71 \text{ V}$, $\log 10 = 1$

24. निम्नलिखित प्रत्येक के लिए संभावित व्याख्या दीजिए :

3

(क) ऐल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रयुक्त होता है।

(ख) 2,2,6-ट्राइमेथिलसाइक्लोहैक्सेनोन, सायनोहाइड्रिन नहीं बनाता है।


(ग) सेमीकार्बेज़ाइड का केवल एक $-\text{NH}_2$ समूह सेमीकार्बेज़ोन विरचन में प्रयुक्त होता है।





SECTION C

22. The following data were obtained during the kinetic studies of the reaction :



Experiment	Initial [A] (mol/L)	Initial [B] (mol/L)	Initial rate of formation of C ($M \text{ min}^{-1}$)
1	0.10	0.10	3.0×10^{-4}
2	0.30	0.30	9.0×10^{-4}
3	0.10	0.30	3.0×10^{-4}
4	0.20	0.40	6.0×10^{-4}

Determine the order of reaction with respect to each reactant and the overall order of the reaction. Write the rate law expression for the reaction. 3

23. Calculate emf of the following cell at 298 K : 3



Given : $E^{\circ}_{\text{cell}} = 2.71 \text{ V}$, $\log 10 = 1$


24. Give plausible explanation for each of the following : 3

- Sodium hydrogen sulphite is used for separation and purification of aldehydes.
- 2,2,6-trimethylcyclohexanone does not form cyanohydrin.
- Only one $-\text{NH}_2$ group of semicarbazide is involved in the formation of semicarbazone.



25. (क) निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में 'A' से 'F' तक को पहचानिए :

3



(ख) क्या होता है जब :

3

- (i) मेथिल क्लोराइड को KCN के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?
- (ii) मेथिल ब्रोमाइड को शुष्क ऐसीटोन में NaI के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?
- (iii) मेथिल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लुओराइड के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?

26. (क) संकुल $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{CN})(\text{en})_2]^{2+}$ का IUPAC नाम लिखिए ।

(ख) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ का संकरण लिखिए और इसके चुम्बकीय व्यवहार की प्रागुक्ति कीजिए ।
[परमाणु संख्या : Ni = 28]

(ग) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ के द्वारा किस प्रकार की समावयवता दर्शाई जाती है ?

3

27. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

3

- (क) ऐल्कोहॉल की तुलना में फ्रीनॉल अधिक अम्लीय होता है ।
- (ख) तृतीयक-ब्यूटिल ब्रोमाइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद ऐल्कीन देता है न कि ईथर ।
- (ग) *p*-नाइट्रोफ्रीनॉल भाप द्वारा वाष्पित नहीं होता है जबकि *o*-नाइट्रोफ्रीनॉल भाप द्वारा वाष्पित होता है ।


28. मेथेनेमीन, बेन्ज़ॉयल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद 'P' निर्मित करता है । 'P' की संरचना और IUPAC नाम दीजिए । क्या 'P' हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया दे सकता है ? यदि हाँ, तो उत्पाद की संरचना दीजिए । यदि नहीं, तो कारण दीजिए ।

3





25. (a) Identify 'A' to 'F' in the following reaction sequence : 3



OR

(b) What happens when : 3

- (i) methyl chloride is treated with KCN ?
- (ii) methyl bromide is treated with NaI in dry acetone ?
- (iii) methyl bromide is treated with silver fluoride ?

26. (a) Write IUPAC name of the complex $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{CN})(\text{en})_2]^{2+}$.

(b) Write the hybridization of $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ and predict its magnetic behaviour. [Atomic number : Ni = 28]

(c) What type of isomerism is shown by $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$? 3

27. Give reasons for the following : 3

- (a) Phenol is more acidic than alcohol.
- (b) *t*-butyl bromide on reaction with sodium ethoxide gives alkene as main product and not ether.
- (c) *p*-nitrophenol is not steam volatile while *o*-nitrophenol is steam volatile.

28. Methanamine reacts with benzoyl chloride to form a product 'P'. Give the structure and IUPAC name of 'P'. Can 'P' undergo Hoffmann bromamide degradation reaction ? If yes, then give the structure of the product. If no, then give reason.



खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. मधुमेह (डायबिटीज़) को नियंत्रित करने के लिए कार्बोहाइड्रेटों की मात्रा कम करें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएँ, वृद्ध व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेटों की मात्रा अधिक कम करने की आवश्यकता है। एक औसत भारतीय 61 – 64% तक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेटों से समृद्ध खाद्य पदार्थों का उपभोग करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज़ केयर में प्रकाशित एक अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह (डायबिटीज़), जो पूरे विश्व में मृत्यु का एक मुख्य कारण है, के घटाव और रोकथाम के लिए इसे 49 – 56% कम करने की सिफारिश की है। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि कुल ऊर्जा खपत के लिए कार्बोहाइड्रेटों का अंतर्ग्रहण कम करने के साथ-साथ प्रोटीन के अंतर्ग्रहण में 14 – 20% वृद्धि की जानी चाहिए। कुल ऊर्जा खपत में वसा का योगदान 21 – 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में, किसी प्लेट में 50% फल तथा हरी सब्जियाँ, 25% कार्बोहाइड्रेट और 25% प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ होने चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ इन्सुलिन की कमी से होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) कार्बोहाइड्रेटों के कोई दो प्रकार्य लिखिए। 2
- (ख) मोनोसैकेराइड क्या हैं ? 1
- (ग) (i) विटामिन D की कमी से होने वाले हीनता जनित रोगों के नाम लिखिए। 1
- अथवा**
- (ग) (ii) उस हॉर्मोन का नाम लिखिए जो रक्त में ग्लूकोस की मात्रा को सीमित रखता है। 1

30. संक्रमण धातुओं के संकुलों की एक विशिष्ट विशेषता उनके रंगों का विस्तृत (रेंज) परास है। इसका अर्थ है कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श (sample) में से होकर बाहर निकलता है तो ये दृश्य स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश अब श्वेत नहीं रहता। संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। पूरक रंग अवशेष तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्पन्न रंग होता है। यदि संकुल हरा प्रकाश अवशोषित करता है, तो यह लाल दिखाई पड़ता है। नीचे दी गई सारणी में प्रकाश के विभिन्न अवशोषित तरंगदैर्घ्य तथा प्रेक्षित रंग के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं।





SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

29. Reduce carbohydrates, increase protein to check diabetes, older people may need greater carbohydrates reduction. An average Indian derives 61 – 64% of energy from consumption of food rich in carbohydrates. A study published in the Journal of Diabetes Care has recommended reducing this to 49 – 56% for remission or prevention of Type 2 diabetes, one of the leading cause of death worldwide. Along with reducing carbohydrate intake, the study suggests that one should also increase protein intake up to 14 – 20% of the total energy consumption. Fat should contribute not more than 21 – 27% of the total energy consumption. In simple words, 50% of the plate should consist of fruits and green vegetables, 25% carbohydrates, 25% food rich in protein. Type 1 diabetes is due to deficiency of insulin.

Answer the following questions :

- (a) Write any two functions of carbohydrates. 2
- (b) What are monosaccharides ? 1
- (c) (i) Write the name of the deficiency diseases caused due to the lack of Vitamin D. 1

OR

- (c) (ii) Name the hormone which maintains the glucose level within narrow limit in the blood. 1

30. One of the most distinctive properties of transition metal complexes is their wide range of colours. This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. The colour of the complex is complementary to that which is absorbed. The complementary colour is the colour generated from the wavelength left over. If green light is absorbed by the complex, it appears red. Table given below, gives the relationship between different wavelengths of the light absorbed and the colour observed.



उपसहसंयोजन सत्ता	अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य (nm)	अवशोषित प्रकाश का रंग	उपसहसंयोजन सत्ता का रंग
$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$	535	पीला	बैंगनी
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$	500	नीला-हरा	लाल
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	475	नीला	पीला-नारंगी
$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$	310	पराबैंगनी	हल्का पीला
$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	600	लाल	नीला
$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	498	नीला-हरा	बैंगनी

(क) स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है ? Δ_t और Δ_0 के मध्य संबंध लिखिए। 2

(ख) (i) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ और $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ को अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1

अथवा

(ख) (ii) क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर d^5 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए यदि $\Delta_0 < P$ है। 1

(ग) क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 1

खण्ड ड

31. (क) (i) एक कार्बनिक यौगिक 'P' ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$) ऑक्सीकृत होकर यौगिक 'Q' देता है। बेन्ज़ीन की निर्जल AlCl_3 की उपस्थिति में ऐसीटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी यौगिक 'Q' प्राप्त किया जा सकता है। 'Q' ने जलीय NaOH में I_2 के साथ अभिक्रिया करके 'R' और एक पीला यौगिक 'S' दिया। 'P', 'Q', 'R' और 'S' की पहचान कीजिए।

(ii) प्राप्त उत्पाद/उत्पादों की संरचना/संरचनाएँ लिखिए जब सांद्र KOH की उपस्थिति में बेन्ज़ैल्डिहाइड गरम किया जाता है। 4+1

अथवा





Coordination Entity	Wavelength of light absorbed (nm)	Colour of light absorbed	Colour of coordination entity
$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$	535	Yellow	Violet
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$	500	Blue-green	Red
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	475	Blue	Yellow-orange
$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$	310	Ultra-Violet (U.V.)	Pale Yellow
$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	600	Red	Blue
$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	498	Blue-green	Violet

- (a) What is spectrochemical series ? Write the relationship between Δ_t and Δ_o . 2
- (b) (i) Arrange $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ and $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ in increasing order of wavelength of light absorbed. 1

OR

- (b) (ii) On the basis of crystal field theory, write the electronic configuration of d^5 ion if $\Delta_o < P$. 1
- (c) Define crystal field splitting energy. 1

SECTION E

31. (a) (i) An organic compound 'P' ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$) on oxidation gave compound 'Q'. The compound 'Q' can also be obtained from a reaction of benzene with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl_3 . 'Q' on treatment with I_2 in aq. NaOH gave 'R' and a yellow compound 'S'. Identify 'P', 'Q', 'R' and 'S'.
- (ii) Give the structure(s) of the product(s) when benzaldehyde is heated in the presence of conc. KOH . 4+1

OR



- (ख) (i) निम्नलिखित रूपान्तरण संपन्न कीजिए :
- (I) प्रोपेनोन से प्रोपेन
(II) ऐसीटोफ्रीनोन से बेन्जोइक अम्ल
(III) बेन्जिल क्लोराइड से फेनिलएथेनोइक अम्ल
- (ii) निम्नलिखित यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए :
- (I) बेन्जैल्डिहाइड और फ्रीनॉल
(II) ब्यूटेनैल और ब्यूटेन-2-ओन 3+2

32. (क) (i) पाइरोलुसाइट अयस्क (MnO_2) से पोटैशियम परमैंगनेट के विरचन में सम्मिलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
- (ii) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :
- (I) Sc (परमाणु संख्या 21) के लवण श्वेत होते हैं।
(II) $E^\circ_{Cu^{2+}|Cu}$ धनात्मक है जबकि $E^\circ_{Mn^{2+}|Mn}$ ऋणात्मक है।
(III) संक्रमण धातुओं की कणन एन्थैल्पी के मान उच्च होते हैं। 2+3

अथवा

- (ख) (i) निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए :
- (I) $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2S(g) + H^+ \longrightarrow$
(II) $Cu^{2+}(aq) + I^-(aq) \longrightarrow$
- (ii) कारण दीजिए :
- (I) लैंथेनॉयडों के मिश्रण का पृथक्करण कठिन होता है।
(II) मैंगनीज की अपेक्षा क्रोमियम का गलनांक उच्चतर होता है।
(III) Zn की दो से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना कठिन होता है। 2+3





- (b) (i) Carry out the following conversions :
- (I) Propanone to Propane
 - (II) Acetophenone to Benzoic acid
 - (III) Benzyl chloride to Phenylethanoic acid
- (ii) Give a simple chemical test to distinguish between the following pairs of compounds :
- (I) Benzaldehyde and Phenol
 - (II) Butanal and Butan-2-one 3+2

32. (a) (i) Write the chemical equations involved in the preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore (MnO_2).
- (ii) Give reasons for the following :
- (I) Sc (Atomic No. 21) salts are white.
 - (II) $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}}$ is positive whereas $E^\circ_{\text{Mn}^{2+}|\text{Mn}}$ is negative.
 - (III) Transition metals have high enthalpies of atomisation. 2+3

OR

- (b) (i) Complete and balance the following chemical equations :
- (I) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g}) + \text{H}^+ \longrightarrow$
 - (II) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow$
- (ii) Give reasons :
- (I) Separation of mixture of lanthanoids is difficult.
 - (II) Chromium has higher melting point than manganese.
 - (III) It is difficult to obtain oxidation state greater than two for Zn. 2+3



33. (क) (i) परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। यह अणुसंख्य गुणधर्म क्यों माना जाता है ?
- (ii) 400 K पर दो शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 700 mmHg हैं। द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब 600 mmHg है।

2+3

अथवा

- (ख) (i) फ़ीनॉल और ऐनिलीन को परस्पर मिलाए जाने पर राउल्ट नियम से किस प्रकार का विचलन अपेक्षित है ? मिश्रण के नेट आयतन और एन्थैल्पी में क्या परिवर्तन अपेक्षित है ?
- (ii) 750 mmHg पर जल का क्वथनांक 99.48°C है। 500 g जल में कितना सूक्रोस ($M = 342 \text{ g mol}^{-1}$) मिलाया जाए ताकि यह 100°C पर क्वथन करे ?
[जल के लिए $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$]

2+3





- 33.** (a) (i) Define osmotic pressure. Why is it considered as a colligative property ?
- (ii) The vapour pressure of two pure liquids A and B at 400 K are 450 and 700 mmHg respectively. Find out the composition of liquid mixture if the total vapour pressure of mixture is 600 mmHg. 2+3

OR

- (b) (i) What type of deviation from Raoult's law is expected when phenol and aniline are mixed with each other ? What change in the net volume of the mixture and enthalpy is expected ?
- (ii) Boiling point of water at 750 mmHg is 99.48°C. How much sucrose ($M = 342 \text{ g mol}^{-1}$) is to be added to 500 g of water such that it boils at 100°C ? [K_b for water = $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$] 2+3

